

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 05.11.1992 - 2574

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	800 g/100 L su dal sıracası varsa 400 g/100 L su dal sıracası yoksa	21 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	800 g/100 L su dal sıracası varsa 400 g/100 L su dal sıracası yoksa	21 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	400 g/100 L su normal dönem 800 g/100 L su dormant dönem	21 gün
Şeftali	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	800 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
Erik	Yaprak kıvrıcıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	800 g/100 L su	21 gün
Antepfıstığı	Cep hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	800 g/100 L su	21 gün
Turunçgiller	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	500 g/100 L su	21 gün
Zeytin	Uç kurutan (<i>Phoma tracheiphila</i>)	400 g/100 L su	21 gün
Bağ*	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginum</i>)	400 g/100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
	Antraknoz (<i>Elsinoe ampelina</i>)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
	Mildiyö** (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 g/100 L su	14 gün
	Bakteriyel benek (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)	300 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
	Bakteriyel leke (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	300 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 g/100 L su	14 gün

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş



LANCES LİNK A.Ş.

THANOS 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Yutulması sonucunda hastada kusma, bayılma, hipokalemi ve kanda üre yükselmesine neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin.

Deriye teması halinde, kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahrış durumunda, doktora başvurun.

Göze teması halinde, hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

Solunması halinde, Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktoru/hekimi arayın.

Yutulması halinde, hemen doktora başvurun. Hemen ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketini gösterin. Birinci acık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin. KUSTURMAYIN.

NET MİKTARI (kg) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:
Bakır oksiklorid

ZARARLILIK İŞARETİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H301:Yutulması halinde toksiktir.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

24 Ocak 2020

GIDA

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Genel Müdür Yardımcısı V.

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Fasulye	Antraknoz (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	500 g/100 L su	14 gün
	Adi yaprak yanıklığı (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i>)	300 g/100 L su	14 gün
	Hale yanıklığı (<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolica</i>)	300 g/100 L su	14 gün
	Domates, Patlıcan, Patates	500 g/100 L su	14 gün
Yerfıstığı	Serkospora erken yaprak lekesi (<i>Cercospora arachidicola</i>)	400 g/100 L su	14 gün
Sebze fideleri	Çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama (fidelik uygulaması)	14 gün
Hıyar	Köşeli yaprak lekesi (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Şerbetçiotu	Mildiyö (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)	500 g/100 L su	14 gün
Aspir	Yaprak lekesi (<i>Alternaria carthami</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Tütün	Fidelerde çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Sclerotinia sclerotium</i>)	400 g/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş



LANCES LİNK A.Ş.

THANOS 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	-------------------------

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir,

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Isı, ateş ve nemden uzakta depolayınız. Fiziksel ve ısı hasarlarından koruyunuz.
- Metalik kaplarda depolamayınız.

24 Ocak 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yücel BAKIRCI
Genel Müdür Yardımcısı/V.

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

Elma Karalekesi

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün ara ile yapılmalıdır.

Armut Karalekesi

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı, Şeftali)

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayıslarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıcıklığı

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Eriklerde Cep Hastalığı

1. uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında Karazenk

1. uygulama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa: uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa: meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgillerde Uç Kurutan

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş



LANCES LINK A.S.

THANOS 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

24 Ocak 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. İsmail YILMAZ
Genel Müdür Yardımcısı V.

Q. Balance

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

Zeytinlerde Halkalı Leke

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde:

1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ Mildiyözü

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığına uygulamalara son verilmelidir.

Bağ Antraknozu

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiyözü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Aynı ilaçlama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır:

1. uygulama: Sürgünler 5-10 cm,
2. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungisit'in etki süresi dikkate alınarak yapılır. Tanelerin yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.

Domates Mildiyözü

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domateste Bakteriyel Benek

Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates Bakteriyel Leke

Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş



LANCES LİNK A.Ş.

THANOS 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı, ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

24 Ocak 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

Patates Mildiyözü

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Fasulye Antraknozu

Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlamasına özen gösterilmelidir.

Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı ve Hale Yanıklığı

Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan ve Patateste Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelikte, gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulanmaya devam edilir.

Yerfıstığında Serkospora Erken Yaprak Lekesi

Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Sebzede Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü

Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra ise fidelerin toprak yüzüne çıkışından ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi

Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu Mildiyözü

İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10'ar gün aralıklarla devam edilir.

Aspir Yaprak Lekesi

Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.

Tütün Fidelerinde Çökerten

Tohumlar ekilip, kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

THANOS 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **THANOS 50 WP**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Çok asidik veya çok alkali olanları hariç, **THANOS 50 WP** insektisit, akarisit ve fungusitler ile karıştırılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.



LANCES LINK A.Ş.

THANOS 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ÜRETİCİ FİRMA:

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.

Los Yacimientos 1301 Maipú, Santiago-ŞİLİ

Tel. : +56 2 2381 7000

ÜRETİM TESİSİ:

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.

Los Yacimientos 1301 Maipú, Santiago-ŞİLİ

Tel. : +56 2 2381 7000

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe – Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 411 12 24 (3 hat)



24 Ocak 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR