

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

Bitki	Doz	Uygulama Dönemi
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik, Narenciye vb.)	Yapraktan: 150-200 ml/100 lt su Topraktan: 1-2lt/da	Vejetatif gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.)	Yapraktan: 100-200 ml/100 lt su Topraktan: 0.5-1lt/da	Fide şaşırtma ile birlikte gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama
Bağ	Yapraktan: 100-150 ml/100 lt su Topraktan: 0.5-1lt/da	Sürgün gelişim döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik,	Yapraktan: 100-150ml/da	Kardeşlenme öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama, Kardeşlenme sonrası 2 uygulama
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği Mısır	Yapraktan: 150-200 ml/da Topraktan: 1-2lt/da	Bitkiler 20-25 cm boyuna ulaştıktan sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk	Yapraktan 100-150ml/da Topraktan 1-1.5lt/da	Tarakanma başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Çilek	Yapraktan 100-150 ml/da Topraktan 0.5-1lt/da	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 1-2 uygulama, çiçek sonrası 1-2 uygulama
Zeytin	Yapraktan: 150-200 ml/100 lt su Topraktan: 1-2lt/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 3-4 uygulama
Kesme çiçekçilik, Fidan yetiştiriciliği	Damlama: 0.5-1lt/da	Ekimden veya dikimden sonra 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama



ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER SIVI HÜMİK ASİT

HUMINEO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Toplam Organik madde11

Toplam Humik Asit + Fulvik Asit18

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O).....5

pH11,5-13,5

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi:
Son kullanma Tarihi:
Şarj numarası:
Lisans no: 1385
Tescil no:

Net miktar: L

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

ÜRÜNÜN KULLANIMI

Tank yarıya kadar su ile doldurulur. Önce tavsiye edilen dozda Humiterra sonra eğer kullanılacaksa yaprak gübresi veya tarım ilacı ilave edilerek tank su ile tamamlanır ve karıştırıldıktan sonra topraktan veya yapraktan uygulanır.

KARIŞABİLİRLİK

Gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

DE SANGOSSE SAS

Bonnel-CS-10005

47480 Pont-Du-Casse / FRANSA

Tel: +33 05.53.69.36.30

İTHALATCI

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

www.lanceslink.com

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No: 32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy - İSTANBUL
Yatırımcı V.D. 999 001 4269