

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No'su : 11.01.2022/12206

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma	Kullanma Dozu ve Dönemi	PHI* (gün)
PAMUK***	Yeşilkurt * (<i>Helicoverpa armigera</i>)	150 ml/da (Larva ve Yumurta dönemi)	7
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/da (Nimf ve Ergin)	
ELMA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su (Larva dönemi)	3
	Elma ağkurdu (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	10 ml/100 L su (Larva dönemi)	
BAĞ **	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 ml/100 L su (Larva dönemi)	7
MISIR	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)	50 ml/da (Larva dönemi)	14
	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	30 ml/da (Larva dönemi)	
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	15 gün ara ile 3 uygulama	
	Yaprakbiti (<i>Rhopalosiphum maidis</i>)	75 ml/da (Ergin, Nimf)	
PATATES	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	40 ml/da (Larva ve Ergin)	3
BUĞDAY	Süne (<i>Eurygaster spp</i>)	20 ml/da (1.-3. Nimf dönemi ve 4.-5. Nimf dönemi)	14
	Hububat hortumlu böceği (<i>Pachytychius hordei</i>)	25 ml/da (Ergin)	14
	Ekin kamburböceği (<i>Zabrus spp.</i>)	50 ml/da (Larva dönemi)	14
	Toprak pireleri (<i>Phyllotreta spp., Psylliodes spp</i>)	30 ml/da (Ergin)	-
DOMATES	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da (Larva dönemi)	3
LAHANA	Lahana yaprakgüvesi (<i>Plutella maculipennis</i>)	25 ml/da (Larva dönemi)	2
ANTEPFİSTİĞİ	Antepfıstığı pisillidi (<i>Agonosca pistaciae</i>)	20 ml/100 L su (Nimf dönemi)	3
ZEYTİN	Zeytin güvesi (<i>Prays oleae</i>)(Çiçekte)	15 ml/100 L su (Larva dönemi)	3
FINDIK	Findık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	50 ml/da (Ergin dönemi)	7
	Findık Filiz güvesi (<i>Gypsonoma dealbana</i>)	30 ml/da (İlkbahar Nesli)	3
	Findık Filiz güvesi (<i>Gypsonoma dealbana</i>)	30ml/da (Larva-Hasat sonrası)	3
ARMUT	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su (Larva dönemi)	3
AYVA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su (Larva dönemi)	3

* Pamukta Yeşil kurt tavsiyesinde Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

***Pamukta kırmızı örümceğe karşı yalnız ege bölgesinde kullanılır.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

SHINYA

EMULSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	--------------------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLYARDIM ÖNLEMLERİ

Göz teması: Varsa kontak lensleri çıkarın. Gözle temas durumunda, acil olarak en az 15 dakika süreyle akan temiz bol su ile yıkayın.

Gerekliyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Cilt teması: Ürünle bulaşmış giysileri çıkarın. Etkilenmiş cilt bölgesini su ve hafif bir sabunla yıkayın. Sıcak suyla durulayın. Hastalık etkisi veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkarın. Solunumun zorlaşması halinde oksijen veriniz. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayınız. Acilen tıbbi yardım alın.

Yutma: Kusturmaya zorlamayın. Derhal tıbbi yardım alın, mümkünse ürünün etiketini gösterin.

ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER

Ürünün yutulması halinde mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat edilerek dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Doktor kontrolünde TOXOGONIN gibi oximli preparatlara ilaveten ATROPIN kullanılabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

19 Nisan 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Aza. Per. Sat. Fiyatı (KDV' li) :
İÇİNDEKİLER
Lambda-cyhalothrin, Ksilen, Sikloheksanon, Emulsifier
UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İŞARETLERİ



ZARARLILIK İFADELERİ

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM İFADELERİ

- P210 Isırdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P261 Tozunu, dumanını, gazını, sisini, buharını, spreyini solumaktan kaçınınız.
P280 Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenler, yüz koruyucu kullanın
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf edin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- SHINYA tüm koruyucu tedbirler alınarak orijinal ambalajında depolanmalıdır.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
- İlaçlamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp, el ve yüzünüzü bol su ve sabunla yıkayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazım Karabekir Mah. 296. Sk. Blok B Kat: 217
35100 İZMİR T.C. 0232 222 11 44
Hesap Numarası: 08 001 426
Sermaye: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

BORA KANBAR
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü, önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.

Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

İki noktalı kırmızı örümceklerle karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ürünler ile uygulama yapılmalıdır. Zararlıların tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızı örümcek ulaşıp ise kaplama uygulama yapılmalıdır.

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.


Elma ağkurdur: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C' ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölde karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölde uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmez. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Buğday ekin kamburböceğine karşı: Yüzey uygulaması yapılır.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

SHINYA

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında açılmadan normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziki, kimyevi ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti eder. İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.

19 Nisan 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Tuzluklu Mah. 296. Sok. No: 8 E. Kapı No: 217
35100 Bornova - İZMİR T. 0232 261 41 44
Hasan T. 0232 261 403 001 4265
Sermaye: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

BORA KANBAR
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ

Hububat hortumluböceği: Toprakтан çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Lahana yaprak güvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında uygulamaya karar verilir.

Zeytin güvesi: Zararının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10 'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk keleklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

SHINYA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için SHINYA'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

SHINYA

EMULSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

ÜRETİM TESİSİ

FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK

NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Kayacık Mah. Konya Org. San. Böl. Lalehan Cad. İkipınar Sok. No: 17
Selçuklu KONYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdırık Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217

35100 Bornova İZMİR

Tel: 0232 202 11 44

www.lanceslink.com

19 Nisan 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdırık Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217

35100 Bornova İZMİR Tel: 0232 202 11 44

Mersis No: 0608001426500013

Sermaye: 500.000 TL

Mersis No: 0608001426500013

BORA KANBAR
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ