

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU : 31.07.2013/ 9295

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	14 gün
	Ölü kol (<i>Phomopsis viticola</i>)	3500 g/100 L su (kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	14 gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
KAYISI	Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmata carpophila</i>)	1250 g/100 L su (Dormant dönem) 625 g/100 L su (Normal dönem)	14 gün
ZEYTİN	Halkalı leke (<i>Cyclogonium oleaginum</i> = <i>Spilocaea oleaginea</i>)	1.ilaçlama 1500 g/100 L su 2.ilaçlama 1000 g/100 L su	14 gün
ŞEFTALİ	Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g / 100 L su	14 gün
DOMATES	Domates Mildiyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

03 Kasım 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

2/2

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



LANCES LINK

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

BORDOTALİA®

**Suda Dağılıbilir Granül (WG)
BORDO BULAMACI**

GRUP M1 FUNGİSİT

% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızdan alındığında baş ağrısı, kusma ve sindirim sisteminde ağrılara neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluması halinde: Uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktor/hekimi arayın.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Yutulması halinde: Hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Göz ile teması halinde: Hemen bol suyla yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Panzehir, Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA ve D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :

Ek-1

İÇİNDEKİLER:

Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı, Sodyum diizopropil naftalin sülfonat

ZARARLILIK İŞARETİ:



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P260: Tozunu solumayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

Kendi ambalajında, ağız kapalı olarak, normal şartlar altında serin kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağız kapalı olarak yem, gıda maddelerinden ayrı, çocukların ulaşamayacağı yerde kilitli, iyi havalandan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Türk Muh. 299 Sk. No: 8-İç Kapı No: 217
Hizmetler Mah. Kat: 0232 302 11 44
İstanbul - T.C. 34080 001 0265
Sermaye: 3.300.000 TL
Ticaret Sic. No: 0608001426500013

Bora Kanbar
Ruhsatlandırma Müdürü

ETİKETİN DEVAMIDIR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Bağ Mildiyözü; Bağda sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. Meteorolojik şartlar hastalığın çıkmasına uygun giderse ve ilaçlamaların devamına gerek görülürse ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak 10- 14 gün aralıklarla ilaçlamalar yapılabilir.

Bağda Ölükol :

Kış uygulaması : Budamadan sonra gözler uyanmadan.

Yaz uygulaması :

1. uygulama : Sürgünler 2-3 cm boyda iken,
2. uygulama: Sürgünler 8-10 cm boyda iken,
3. uygulama: İlaçlama Sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Elma karaleke:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında, 2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldünce, 4. ve diğer uygulama: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.

Kayısıda Yaprak Delen; 1. uygulama sonbaharda (Dormant dönem) yaprak dökümünden hemen sonra yapılır. 2. uygulama ilkbaharda (ilkbahar uygulaması) çiçek tomurcuklarının kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır. 3. İlaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır.

Zeytin Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde :

1. uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce.

Ege Bölgesinde:

1. uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama :İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Akdeniz Bölgesinde :

1. uygulama : Hasattan sonra,
2. uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Şeftalide yaprak kıvrıklığı:

1. uygulama : Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra
2. uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Domates Mildiyözü: İlaçlamalara ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak 10 gün ara ile ilaçlama tekrarlanarak iki kez uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BORDOTALİA isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BORDOTALİA**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLILIK DURUMU:

BORDOTALİA diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

03 Kasım 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

BORDOTALİA®

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

BORDO BULAMACI

GRUP	M1	FUNGİSİT
------	----	----------

% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı



Ek-1

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı b ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden ve bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ile imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ :

MANİCA S.P.A

VIA ALL'ADIGE 4

38068 ROVERETO (TRENTO) İTALYA

Tel: +39 0464 433705

RUHSAT SAHİBİ:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217

35100 Bornova İZMİR

Tel: 0232 202 11 44

www.lanceslink.com

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Haberleşme No: 08 081 4265
Sermaye: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

Bora Kanbar
Ruhsatlandırma Müdürü