İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 01.07.1996 - 2968

KULLANILDIĞI BİTKİ, HASTALIK VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	
Bağ	Bağ küllemesi (*Erysiphe necator*)	400 g/100 L su	
	Bağ yaprak uyuzu (*Eriophyes vitis*)	490 g/100 L su	
Elma	Külleme (*Podosphaera leucotricha*)	400 g/100 L su	
Şeftali, Nektarin	Külleme (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*)	400 g/100 L su	
Gül (Süs bitkisi)	Külleme (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae*)	400 g/100 L su	
Begonya (Süs bitkisi)	Külleme (*Microsphaera begoniae*)	300-350 g/100 L su	
Nohut	Antraknoz (*Ascochyta rabiei*)	300 g/100 L su	
Soğan	Soğan mildiyösü (*Peronospora destructor*)	300 g/100 L su	
Fasulye	Fasulye Pası (*Uromyces appendiculatus*)	300 g/100 L su	
Hıyar, Kornişon	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum*)	400 g/100 L su	185 g/da*
Turunçgiller	Turunçgil Kırmızıörümceği (*Panonychus citri*)	600 g/100 L su	
	Turunçgil Tomurcuk Akarı (*Aceria sheldoni*)	600 g/100 L su	

Kükürtlü ilaçlar ile yazlık yağlar arasında en az 1 aylık süre olmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
*Hıyar ve kornişon - Kabakgillerde külleme tavsiyesi için dekara uygulamalarda 47 litre su kullanılmalıdır.

12 Kasım 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR. BU ETİKET TOPLAM 3 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.

LANCES LINK by DSG

ACOIDAL 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	M2	Fungisit (Mantar İlacı) Akarisit (Kırmızıörümcek İlacı)

% 80 Kükürt

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Yutulması sonucunda hastada kusma, bayılma, hipokalemi ve kanda üre yükselmesine neden olabilir.

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

NET MİKTARI (kg) :
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :
İÇİNDEKİLER:
Kükürt

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H315: Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P):
P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakınız).
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501: İçeriği/Kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VEYA DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
- Kabakgiller Kükürte hassastır.
- Kayısı Kükürte hassastır.
- Yağ uygulamalarından en az 1 ay sonra uygulanmalıdır.
- İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

LANCES LİNK
KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.293 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş DEMİR
Şirket Yetkilisi

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi
1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Yaprak Uyuzu
Bağ küllemesine karşı kullanılan ilaç bu zararlıyı da kontrol altına aldığından, bağ yaprak uyuzuna karşı özel bir ilaçlama gerekmez.

Elma Küllemesi
1. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 60 –70'i döküldüğü dönemde,
3. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Şeftali ve Nektarinde Şeftali Küllemesi
1. ilaçlama: Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce ilk ilaçlama yapılmalıdır.
2. ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişimi, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilmelidir.

Gül Küllemesi
Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi ve hastalığın seyrine göre ilaçlamalar tekrarlanabilir.

Begonya Küllemesi
Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görülünce ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile ilaçlama tekrarlanır.

Hıyar ve Konişon-Kabakgillerde Külleme
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Soğan Mildiyösü
Kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

ETİKETİN DEVAMI ÜÇÜNCÜ SAYFADADIR

LANCES LINK
by DSG

ACOIDAL 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	M2	Fungisit (Mantar İlacı) Akarisit (Kırmızıörümcek İlacı)

% 80 Kükürt

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Ürün ambalaj ve etiketini beraberinizde bulundurun. Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin.
Deriye teması halinde, kirlenen giysiyi çıkarın, su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın
Göze teması halinde, hemen bol suyla yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.
Solunması halinde, uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktor/hekimi arayın.
Yutulması halinde, hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
TEL:114

12 Kasım 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923
Dr. Nesrin ÇAKIR KARACA
Daire Başkanı

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

LANCES LİNK
KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş

Nohut Antraknozu
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.
Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Fasulye Pası
Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından ilaçlamaya gerek yoktur.

Turunçgil Kırmızıörümceği
İlaçlamaya zararlı taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra da ilaçlama yapılabilir. Ağaçların içi ve dışı, yaprakların alt ve üst yüzeyleri iyice ilaçlanmalıdır. Günün en sıcak ve yapraklardaki çiğ dolayısıyla sabahın erken saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır.

Turunçgil Tomurcukakarı
Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göre ilkbaharda sürgünler 8-10 cm olduğu zaman eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla olduğu Mart sonu Nisan başı ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan 20-25 gün sonra ilaçlama tekrarlanır.

ACOIDAL 80 WG hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
ACOIDAL 80 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungisit - akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACOIDAL 80 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
ACOIDAL 80 WG' nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

12 Kasım 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

LANCES LINK
by DSG

ACOIDAL 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	M2	Fungisit (Mantar İlacı) Akarisit (Kırmızıörümcek İlacı)

% 80 Kükürt

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
TEL:114

Dr. Nesrin CAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ÜRETİCİ FİRMA:
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Los Yacimientos 1301, Maipū
Santiago – ŞİLİ
Tel. : + 562 2381 7000

ÜRETİM TESİSİ:
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Los Yacimientos 1301, Maipū
Santiago – ŞİLİ
Tel. : + 562 2381 7000

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
Bornova / İZMİR
Tel: 0 (232) 202 11 44
www.lanceslink.com

LANCES LİNK
KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş DEMİREL