

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No'su : 08.02.2022/12249

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Kabak	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da	3 gün
Domates (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da 100 ml/100 L su (Larva)	3 gün
Patlıcan (Tarla)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da (Larva-Pupa-Ergin)	3 gün
Fasulye	Bakla yaprakbiti (<i>Aphis fabae</i>)	50 ml/da	3 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	15 ml/100 L su	3 gün
	Elma ağkurdu (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	5 ml/100 L su	
Bağ*	Dürmece (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	30 ml/100 L su	
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı Psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineate</i>)	30 ml/da	3 gün
Nohut, Mercimek	Mercimek Hortumluböceği (<i>Sitona sp.</i>)	50 ml/da	3 gün
	Mercimekte Apion (<i>Apion arrogans</i>)	50 ml/da	
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	20 ml/da	
	Mantolu böcek (<i>Amicta oboberthuri</i>)	30 ml/da	
Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	50 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama)	3 gün
Şekerpancarı	Pancar pireleri (<i>Chaetochasma Spp.</i>)	25 ml/da	3 gün
	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)		
	Kalkan böcekleri (<i>Cassida spp.</i>)		
Hububat	Süne (<i>Eurygaster spp.</i>)	30 ml/da (1-3 dönem nimf)	3 gün
	Hububat hortumluböceği (<i>Pachytichus hordei</i>)	50 ml/da (4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)	
	Hububat hortumluböceği (<i>Pachytichus hordei</i>)	30 ml/da	
	Ekin kamburböceği (<i>Zabrus spp.</i>)	20 ml/da (sahih uygulaması)	
Zeytin	Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	25 ml/100 L su	21 gün
	Zeytin güvesi (<i>Prays oleae</i>)	30 ml/100 L su	
	Zeytin karaçoşnili (<i>Saissetia oleae</i>)	25 ml/100 L su	
Ayçiçeği	Ayçiçeğinde Çayır tırtılı (<i>Loxostege sticticalis</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Yeşilkurt	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Findık	Kırtırtılı (<i>Lymantria dispar</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
Kiraz, Vişne	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Pırasa	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	50 ml/da	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

LANCES LINK
by DSG

AMETRİNE EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

25 g/L Deltamethrin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAHA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mukozayı tahriş eder. Hapşırma, ciltte yanma yapabilir. Ayrıca bulantı, kusma, baş ağrısına sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz teması: Varsa kontak lensleri çıkarın. Gözle temas durumunda, acil olarak en az 15 dakika süreyle akan temiz bol su ile yıkayın. Acı, gözde şimşek çakma hissi, yaşarma veya kızarıklık gözlenirse tıbbi yardım alın.

Cilt teması: Ürünle bulaşmış giysileri çıkarın. Etkilenmiş cilt bölgesini su ve hafif bir sabunla yıkayın. Sıcak suyla durulayın. Hastalık etkisi veya tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.

Soluma: Temiz havaya çıkınız. Solunumun zorlaşması halinde oksijen veriniz. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayınız. Acilen tıbbi yardım alın.

Yutma: Kusturmayın. Yutulmuşsa, maruziyete uğramış kişinin bilinci yerindeyse ağız su ile yıkayın (gargara yaptırın). Tıbbi yardım alın, mümkünse ürünün etiketini gösterin.

ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik göre tedavi uygulanır. Acil durumlarda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına göre 10-20 mg Diazepam (VALIOM) enjekte ediniz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

24 Haziran 2026

Net Miktarı :
Aza. Per. Sat. Fiyatı (KDV' li) :
İÇİNDEKİLER
Deltamethrin, Ksilen, Emulsifier
UYARI KELİMESİ
Tehlike
ZARARLILIK İŞARETLERİ



ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatları uyunuz.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P261 Tozunu, dumanını, gazını, sisini, buharını, spreyini solumaktan kaçının.
P280 Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenler, yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- AMETRİNE tüm koruyucu tedbirler alınarak orijinal ambalajında depolanmalıdır.
- Arılarla zehirli, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklarla zehirli, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
- İlaçlamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp, el ve yüzünüzü bol su ve sabunla yıkayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk. No:6-İc Kapı No:2
35100 Bornova-İZMİR T.C. 0232 202 11 44
Hassa T.C. 0232 202 11 44
Sermaye:85.000.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Bora Kanbar
Ruhsatlandırma Müdürü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ, önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulamanın makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) dekar dozu için 50 L (ilaç normu) su kullanılır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposu güvenli bir şekilde boşaltılır. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Patıcanda ve kabakta Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasulye yaprakbitti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklağillerde 25-50; patıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma içkurdurdu: Elma içkurdurdu'na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdurdu mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Dürmece: İlkbaharda larvaların kışaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Mercimekte Mantolu böceğe karşı: Çok yoğun bulaşmalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.

Mercimekte Apion'a karşı: Ergin mücadelesinde m² ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10'un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte ve Nohutta Yeşilkurta karşı: Nisanın 2. yarısından itibaren yapılan kontrollerde, kullanılan çerçeve (50x50 cm=1/4 m²) içindeki bitkiler silkelenecek düşen larvalar sayılır ve m²'de 5 larva saptandığında uygulamaya başlanır.

Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölde karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölde uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmez. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.



AMETRİNE EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

25 g/L Deltamethrin

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında açılmadan normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl ile ilacın fiziki, kimyevi ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırlar dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti eder. İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğan sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdırık Mah.296 SK.NO:8-İc Kapı No:2
36100 Bornova-İZMİR Tel:0232 262 41 41
Hasan KANBAR 08 608 001 4286
Sermaye:55.500.000 TL
Mersis No:2608001426500013

Bora Kanbar
Ruhsatlandırma Müdürü

24 Aralık 2026

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzeysel ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Toprakdan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır koçankurduna karşı: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Şeker pancarında Pancar pirelerine karşı: Yapraklarda asimilasyon alanının %20'si zarar görmüşse zaman kaybetmeden yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Şeker pancarında bozkurtlara karşı: Tohum ilaçlamasında, ekimden önce 1 m²'de ortalama 2 larva veya küme halinde yabancı otlarda ortalama 1 larva varsa tohum ilaçlaması yapılır. Yeşil aksam ve zehirli yem uygulamasında; şeker pancarının çıkışından sonra tarlaların köşegenleri doğrultusunda gidilerek, en az 5 ayrı yerde 3'er metre sıra uzunluğundaki bitkilerin dipleri kontrol edilir. Sıra üzerinde en az bir kesik bitkiye rastlandığında ve 3 metre sıra uzunluğunda 3 adet larva sayısına ulaşıldığında mücadeleye başlanmalıdır.

Şeker pancarında kalkan böceklerine karşı: Tarlaların köşegenleri doğrultusunda hareket ederek zararlı yoğunluğu tespit edilir ve m² de 20 ergin görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı: Tuzaklarda ilk ergin görüldükten 5-10 gün sonra yapılacak kontrollerde 100 bitkinin 5'inde larva ya da zarar görüldüğünde uygulama yapılır.

Ayçiçeğinde çayır tırtılına karşı: Tarlaların köşegenleri doğrultusunda zikzak yürünerek her 25-30 m'de bir olmak üzere metrekarede 10 adet larva saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. Mücadele en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılmalıdır.

Fındıkta kır tırtılına karşı: İlaçlama gerek olup olmadığını saptamak için bulaşık fındık bahçelerinde; -1-10 da büyüklükte olanlarda 10 ocakta, -10-30 da büyüklükte olanlarda 20 ocakta, -30 da'dan büyük olanlarda 30 ocakta sayım yapılır. Her ocağın 10'ar yaprağında larva sayımı yapılır. 100 yaprağa isabet eden larva sayısı 1 adedi geçince ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama larva çıkışından hemen sonra, mayıs içerisinde yapılmalıdır. Bir ilaçlama yeterlidir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dönünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dönünde ilk keleklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dönüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dönüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin Karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 sinin açıldığı devrede birinci, % 90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Kiraz ve Vişne'de Kiraz sineğine karşı: Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Pırasa Tütün tripsine karşı: bitki gelişmesinin orta dönemlerinde bitki başına ortalama 30 trips mücadele eşliğidir.

AMETRINE hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ

AMETRINE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AMETRINE'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



AMETRİNE EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

25 g/L Deltamethrin

ÜRETİM TESİSİ

FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK

NAKLİYE SAN. İÇ ve DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Kayacık Mah. Konya Org. San. Böl. Lalehan Cad. İkipınar Sok. No: 17
Selçuklu KONYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217


35100 Bornova İZMİR

Tel: 0232 202 11 44

www.lanceslink.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

24 Haziran 2026



LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Halka Teşahhüs No:0608 001 4265
Sermaye:63.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Bora Kanbar
Ruhsatlandırma Müdürü