

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU : 31.07.2013/ 9295

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
BAĞ*	Bağ Mildiyözü (Plasmopara viticola)	500 g/100 L su	21 gün
	Ölü kol (Phomopsis viticola)	3500 g/100 L su (kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	21 gün
ELMA	Karaleke (Venturia inaequalis)	1500 g/100 L su	21 gün
KAYISI	Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)	1250 g/100 L su (Dormant dönem) 625 g/100 L su (Normal dönem)	21 gün
ZEYTİN	Halkalı leke (Cyclogonium oleaginum= Spilocaea oleaginea)	1.ilaçlama 1500 g/100 L su 2.ilaçlama 1000 g/100 L su	21 gün
ŞEFTALİ, NEKTARİN	Şeftali Yaprak Kıvrıklığı (Taphrina deformans)	1500 g / 100 L su	21 gün
DOMATES	Domates Mildiyözü (Phytophthora infestans)	400 g/da	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

23 Temmuz 2013

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.

LANCES LINK
by DSG

BORDOTALIA®
Suda Dağılabilir Granül (WG)
BORDO BULAMACI

GRUP	M1	FUNGİSİT
------	----	----------

% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızdan alındığında baş ağrısı, kusma ve sindirim sisteminde ağrılara neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktor/hekimi arayın.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Yutulması halinde: Hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Göz ile teması halinde: Hemen bol suyla yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Panzehir, Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA ve D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114



NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :

İÇİNDEKİLER:

Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı, Sodyum diizopropil naftalin sülfonat

ZARARLILIK İŞARETİ:



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P260: Tozunu solumayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem, gıda maddelerinden ayrı, çocukların ulaşamayacağı yerde kilitli, iyi havalandan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4266
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş ÖZALP
Saha Yetkilisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Bağ Mildiyözü:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde:

1. ilaçlama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve daha sonraki ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır.

Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

Bağda Ölükol :

Dormant dönem ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. İlaçlama: Gözlerin uyanma (Tomurcuk patlaması) başlangıcında,
2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirlediği dönemde),
4. İlaçlama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Elma karaleke:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde:

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kayısıda Yaprak Delen:

- 1.İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra
- 2.İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır. Kayıslarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Zeytin Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce.
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

*Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1. ilaçlama: Hasattan sonra,
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarinde Şeftali yaprak kıvrıklığı:

- 1.ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
- 2.ilaçlama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Domates Mildiyözü: Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

LANCES LINK
by DSG

BORDOTALIA®
Suda Dağılıbilir Granül (WG)
BORDO BULAMACI

GRUP	M1	FUNGİSİT
------	----	----------

% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR 23 Mart 2015

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden ve bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ile imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ :

MANİCA S.P.A
VIA ALL'ADIGE 4
38068 ROVERETO (TRENTO) İTALYA
Tel: +39 0464 433705

RUHSAT SAHİBİ:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4266
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş Özalp
Genel Müdür

BORDOTALIA hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BORDOTALIA isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BORDOTALIA**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M1 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU:

BORDOTALIA diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

LANCES LINK
by DSG

BORDOTALIA®
Suda Dağılabilir Granül (WG)
BORDO BULAMACI

GRUP	M1	FUNGİSİT
------	----	----------

% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4266
Sermaye: 63.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013



Durmuş D. M. İmza



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. 23 Temmuz 2018

W /