

Bitki	Doz (Yapraktan)	Uygulama Dönemi
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik, Narenciye vb.)	50-100 ml/ 100 lt su	1.uyg. Çiçek öncesi 2. uyg.Taç yapraklar dökülünce 3. uyg. Meyve gelişim dönemi
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Marul, Karnabahar, Brokoli vb.)	100 ml/da	Vejetatif gelişim başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Bağ	75-100 ml/ 100 L su	Çiçeklenme öncesinde, İri koruk döneminde, Tatlı su yürüme döneminde ve Hasat öncesi olmak üzere 4-5 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik	50-100 ml/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Patates, Pancar	50-100 ml/da	Yumru oluşumundan (çiçek başlangıcı) sonra 2-3 uygulama
Pamuk	50-100 ml/da	Taraklanma başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Çilek	50-100 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Zeytin	75-100 ml/ 100 L su	Çiçeklenme başlangıcı, Meyve bağlama döneminde olmak üzere hasada kadar 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama

Damlama sulama ile kullanım dozu	200-250 ml/da	Sezon boyunca 15 gün ara ile uygulanabilir
----------------------------------	---------------	--

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

NK'lı Sıvı Organomineral Gübre

LAMINAR ORIGIN

Organik madde.....	30
Toplam Azot.....	5.4
Üre Azotu.....	3.7
Organik Azot.....	1.7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O).....	4.7
Alginik asit.....	0.8
Serbest Aminoasitler.....	5.5

pH.....	7-9
Maksimum Klor.....	3

- **Asla uygun doz oranını aşmayınız.**
- **Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız**
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Tank yarıya kadar su ile doldurulur. Önce tavsiye edilen dozda Laminar origin sonra eğer kullanılacaksa yaprak gübresi veya tarım ilacı ilave edilerek tank su ile tamamlanır ve karıştırıldıktan sonra bitkilere pülverize edilir. Toprakтан uygulama için tavsiye edilen doz damlama sulama sistemine doğrudan katılır.

Yaprak gübreleri ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

Bonnel-CS-10005
47480 Pont-du-Casse / FRANSA
Tel: +33 5 53 69 36 30

Kazımdırık Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kozumdrilik Mhly, 7265. Sk. No: 8/4 Kapsi No: 217
35100 Borağazlı/İZMİR TL. 0232 202 11 64
Hasan Çelebi Mah. 1468 001 4265
Sermayesi: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

Bora Kanbar
Ruhsatlandırma Müdür