EC FERTILIZER

MADE IN FRANCE

STARMAX FRUCTI

FOLIAR APPLICATION

3-18-0+(3CaO)+(2MgO)+TE
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w (%)
Toplam Azot (N)	3
Nitrat Azotu (N)	3
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	3
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	2
Suda çözünür Bor (B)	0.04
Suda çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.)	0.02
Suda çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.)	0.04
Suda çözünür Molibden (Mo)	0.003
Suda çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA ile şelatlıdır.)	0.03

pH (%1'lik çözelti) : 2.1

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralığı: 3-9
Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn)

Klor (Cl) içeriği:< %0.5 'Kloru düşük'

UYARILAR

- **Asla uygun doz oranını aşmayınız.**
- **Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretici Firma

AGRONUTRITION by DSG
Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidée
31390 CARBONNE / FRANSA
Tel. : +33 561 978 500 www.agronutrition.com

5 L

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz

STARMAX FRUCTI

STARMAX FRUCTI 3-18-0+(3CaO)+(2MgO)+TE başta meyveler olmak üzere bitkilerin çiçeklenme sonrası hücre bölünmesinin hızlandığı meyve gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu Azot, Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum ve mikro elementler içeren bir üründür.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yapraktan)	Uygulama Zamanı
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik, Kayısı vb)	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme döneminden itibaren 2-4 uygulama
Bağ	200-250 ml/100 L su	Yapraklanmadan sonra 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan vb)	200-250 ml/da	Tam yapraklanmadan sonra 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Narenciye	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme döneminden itibaren 2-3 uygulama
Kivi	200-250 ml/100 L su	Çiçek taç yaprak dökümünden sonra 10-20 gün ara ile 3-5 uygulama
Kavun, Karpuz	250 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından sonra 8-15 gün ara ile 3 uygulama
Zeytin	250 ml/100 L su	Çiçeklenme sonrası 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Pamuk, Mısır	250 ml/da	10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Çilek	250 ml/da	Çiçek başlangıcından sonra 8-15 gün ara ile 3 uygulama
Patates, Nohut	250 ml/da	İlk çiçeklenme görülünce 15 gün ara ile 2 uygulama
Süs Bitkileri ve Kesme Çiçekçilik	250 ml/100 L su	Yapraklanmadan sonra 10-15 gün ara ile
Badem, Ceviz	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme döneminden itibaren 15 gün arayla 2-3 uygulama

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
KARIŞABİLİRLİK: Birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.
FİRMA BEYANI: Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

İthalatçı Firma

LANCES LINK by DSG
Lances Link Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8
İç Kapı No: 217, 35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44 www.lanceslink.com



DİKKAT
TAHRİŞ EDİCİDİR

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No (Batch No) :
Lisans No : 1687
Tescil No : 2021TK1856
Net Ağırlık : 6.75 kg

LANCES LİNK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Mersis No: 0608001426500013