İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 26.07.2022/12414

ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER ve DÖNEMLERİ

Bitki Adı	Uygulama Amacı ve Dönemi	Uygulama Dozu
Çekirdeksiz üzüm	1. uygulama, çiçeklenmeden önce salkımlar 4-8 cm boyda iken salkımların boyunu uzatmak amacıyla yapılır. 2. uygulama, tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının %70-80'inin döküldüğü devrede, dane seyreltmesi amacıyla yapılır. 3. uygulama çiçeklenmeden sonra, daneler 3 mm çapına, saçma iriliğine ulaştığı devrede, dane irileştirilmesi amacıyla yapılır.	100 ml/100 L su
Kurutmalık üzümler	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra, verimi arttırmak ve hasadı öne almak için kullanılır.	50 ml/100 L su
Mandarin	Satsuma ve Clemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacıyla çiçeklerin % 70-80'inin açtığı devrede kullanılır.	75 ml/100 L su
Portakal	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için, çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır.	100 ml/100 L su
	Washington Navel çeşidinde meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek amacı ile meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	
Limon	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak amacı ile kullanılır.	50 ml/100 L su
Greyfurt	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacıyla meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.	50 ml//100 L su
Armut	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde verimi arttırmak için, çiçeklerinin %30'unun açtığı devrede kullanılır.	75-100 ml//100 L su
	Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra, partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için donlardan en geç iki gün sonra kullanılır.	25-100 ml/100 L su
Kiraz ve Vişne	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak daneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı dönemde kullanılır.	75 ml/100 L su
Şeftali ve Nektarin	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geciktirir ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini önler.	75 ml/100 L su
Çilek	Mahsule yatmayı sağlamak ve iri meyve elde etmek için kullanılır. Çiçeklenmeden 3-4 hafta önce hazırlanan solüsyon pompası ile püskürtülür.	75-125 ml/100 L su
Enginar	Tufanda enginar yetiştirmek ve yüksek verim almak için enginarların 4-5 yaprak, boylarının 25-30 cm olduğu devrede, hazırlanan solüsyon özellikle bitkilerin göbek kısımlarına pulverize edilir. Normalden fazla gübre verilmeli ve zamanında sulanmalıdır.	125-150 ml/100 L su
Patates	Tohumluk olarak kullanılacak patatesler, dikiminden önce hazırlanan solüsyona dikimden önce daldırılarak muamele edilir ve dikilir. Böylece çimlenme hızlanır ve düzenli çıkış olur.	25-50 ml/100 L su
Marul	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce uygulama yapılır. Soğuk hava şartlarında yüksek doz uygulanır.	50-100 ml/100 L su
Biber	Verimi arttırmak için, çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda hazırlanan solüsyona ilk uygulama bundan 2-3 hafta sonra da ikinci uygulama yapılır.	150 ml/100 L su 75 ml/da
Süs bitkileri	Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için, karanfil, gül, siklamen ve krizantem'de kullanılır.	200-750 ml/100 L su

02 Temmuz 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

LANCES LINK by DSG

VELGIBBER

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	-	Bitki Gelişim Düzenleyici

20 g/L Gibberellic Acid

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını, güvenlik bilgi formunu veya ürün etiketini gösterin).
Solunum: Temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa, derhal suni solunuma başlayın. Tıbbi yardım alın.
Deri ile temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Ürün ile temas eden bölgeyi bol su ve sabunla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.
Göz ile temas: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.
Yutma: Ağzı iyice yıkayın. Bol miktarda su içirin. Gerekiyorsa tıbbi yardım alın.
ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

T.C. Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN Orman Bakanlığı Gıda Genel Müdürlüğü

NET MİKTARI:
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI:
İÇİNDEKİLER:
Gibberellic acid, butil glikol
ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ
Dikkat
ZARARLILIK İFADELERİ
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ
P264 Elleçlemeden sonra ürün ile kirlenen yerlerinizi su ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Her uygulamadan sonra uygulama makinasını temizlemeden diğer zirai uygulamalarda kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI:
Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış, orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

LANCES LİNK
KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Mersis No:0608001426600013
Bora KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
Biber uygulamasında dekar dozu için 50 L (ilaç normu) su kullanılır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

VELGIBBER hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

LANCES LINK by DSG

VELGIBBER

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	-	Bitki Gelişim Düzenleyici

20 g/L Gibberellic Acid

ÜRETİM TESİSİ
FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Kayacık Mah. Konya Org. San. Böl. Lalehan Cad. İkipınar Sok. No: 17
Selçuklu KONYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

02 Temmuz 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

LANCES LİNK
KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013
Bora KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü