

EC FERTILIZER

ZEAFOL

**Bor, Mangan (Mn-Sülfat)
ve Çinko (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w (%)

Suda Çözünür Bor (B)	0.78
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0.78
Suda Çözünür Çinko (Zn)	3.2

5L

6.9 kg

Üretici Firma: FERTIPLUS FRANCE

Tecnosud, Site 21, Bat 2A 1er étage - 230,

Rue James Watt 66100 PERPIGNAN / FRANSa

Tel: +33(0)4 68 22 25 15 www.fertiplus-france.com

FERTIPLUS
by DSG

ZEAFOL

UYARILAR:

Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız. Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yapraktan)	Uygulama Şekli ve Dönemi
Bağ	150-200 ml /100 L su	1. uygulama Sürgünler 5-10 cm iken, 2. ve 3. uygulama 1. uygulamadan sonra 10-15 gün arayla
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Nar vb.)	150-200 ml /100 L su	1. uygulama % 80 çiçeklenme döneminde, 2. uygulama meyve tutumundan sonra
Kavun, Karpuz	150-200 ml/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	150-200 ml /100 L su	Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 3-5 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Enginar, Lahana vb.)	150-200 ml/100 L su 150-200 ml/da (tarla)	1. uygulama dikimden 15 gün sonra, (sera) 2. uygulama çiçeklenme başlangıcı, 3. uygulama meyve tutumunda
Şeker Pancarı	75-100 ml / da	6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama
Tarla bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır, Kanola)	150-200 ml/da	5-6 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Ayçiçeği	150-200 ml/da	1.Uygulama: Yapraklanma dönemi 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi 3.Uygulama: Dane tutum dönemi
Pamuk	150-200 ml/da	Taraklanma başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama
Zeytin	150-200 ml/100 L su	1.Uygulama: Çiçeklenme öncesi 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrası 3.Uygulama: Dane oluşum dönemi
Narenciye	150-200 ml/100 L su	1. uygulama %60-80 çiçeklenme dönemi 2. uygulama. Meyve tutumundan sonra
Çilek	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcı
Fındık	150-200 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü ve meyve tutum dönemlerinde
Yerfıstığı	150-200 ml/da	5-6 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Patates	150-200 ml/da	İlk çiçekler görülünce (Yumru oluşum başlangıcı)

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞILIRLIK: Zeafol birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uyumadıkları eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No (Batch No) :
Lisans No : 1687
Tescil No :
Net Ağırlığı : 6.9 kg
Hacim : 5 L

İthalatçı Firma: LANCES LINK Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

Kazımdırık Mah. 296 Sk. No:8

İz Kapı No: 217, 35100 Bornova İZMİR

Tel: 0232 202 11 44 www.lanceslink.com

LANCES LINK
by DSG